

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ИНЪЕКЦИИ

Октреотид•депо®



Для приготовления суспензии Октреотида-депо точно следуйте нижеприведенной инструкции.

- Упаковка Октреотида-депо должна храниться в холодильнике при температуре +2... +8 градусов
- Не замораживать
- Ампула с растворителем и флакон с Октреотидом-депо должны быть вынуты из холодильника и доведены до комнатной температуры (30-50 минут) непосредственно перед инъекцией
- Для растворения препарата применять только прилагаемый растворитель
- Суспензия Октреотида-депо не должна смешиваться ни с каким другим лекарственным веществом в одном шприце
- Суспензия Октреотида-депо должна готовиться непосредственно перед введением
- Инъекция Октреотида-депо проводится строго внутримышечно
- **Нельзя вводить внутривенно!** При попадании в кровеносный сосуд следует поменять место инъекции и иглу
- Суспензию Октреотида-депо следует вводить немедленно после приготовления
- Вводить препарат должен только обученный медицинский работник



ЗАО «Фарм-Синтез»
117312 Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 15
Телефон +7(495)796-94-33
Факс +7(495)796-94-34
Email: info@pharm-sintez.ru
www.pharm-sintez.ru





РАЗВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА

Флакон с Октреотидом-депо и ампула с растворителем хранятся в холодильнике и доводятся до комнатной температуры непосредственно перед проведением инъекции.

- Флакон с Октреотидом-депо держите строго вертикально! Легко постукивая по флакону, добейтесь, чтобы весь лиофилизат находился на дне флакона.
- Вскройте шприц, присоедините к нему иглу с розовой канюлей для забора растворителя (использовать только прилагаемую ампулу).
- Вскройте и наберите в шприц все содержимое ампулы с растворителем, установите шприц на дозу 2 мл.
- ! **Растворитель нельзя вводить, не подготовив флакон с Октреотидом-депо!**
- Снимите пластиковую крышку с флакона, содержащего Октреотид-депо. Проздезинфицируйте резиновую пробку спиртовым тампоном (прилагается в упаковке). Введите иглу во флакон с Октреотидом-депо через центр резиновой пробки. **Не касаясь порошка на дне флакона, осторожно введите растворитель по внутренней стенке флакона.** Выньте шприц из флакона.
- ! **Не вводите растворитель непосредственно в лиофилизат!**
- Не трогайте флакон до тех пор, пока растворитель не смочит полностью весь лиофилизат Октреотида-депо. После того как лиофилизат полностью пропитался растворителем (это примерно занимает 2-5 минут), необходимо осторожно, не переворачивая флакон, проверить наличие сухого лиофилизата во флаконе. При обнаружении, оставьте флакон до полного пропитывания. Подготовьте пациента к инъекции.
- ! **Лиофилизат Октреотида-депо должен быть полностью пропитан растворителем.**
- ! **Никогда не переворачивайте и не встряхивайте флакон!**
- В течение 30-60 сек флакон осторожно медленно вращайте до образования однородной суспензии.
- Наклоните флакон под углом 45 градусов, затем, опустив срез иглы вниз, медленно наберите в шприц все содержимое флакона.
- ! **Не переворачивайте флакон при наборе.**
- Сразу смените иглу.

ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА

- ! **Суспензия Октреотида-депо вводить немедленно после приготовления!**
- Переверните шприц в вертикальное положение, чтобы достичь однородности суспензии. Удалите воздух из шприца, надавив слегка на поршень.
- Проздезинфицируйте место инъекции. Инъекция должна проводиться только глубоко внутримышечно в ягодичную мышцу. Введите иглу глубоко в ягодичную мышцу, потяните поршень шприца на себя, чтобы убедиться, что не поврежден кровеносный сосуд.
- Введите медленно суспензию.
- При закупорке иглы замените ее другой.



Внимательно ознакомьтесь с полной информацией о препарате перед применением.